

大腸がん

レジメン名	使用薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース(日)
FOLFIRI療法	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
IRIS療法	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 15	28
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
m.FOLFOX6療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
SOX療法	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	21
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
XELOX療法	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	21
	カベシタビン	2000 mg/m ²	経口		Day1-14	
アバスチン+FOLFIRI療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
アバスチン+IRIS療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1, 15	28
	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 15	
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	

アバスタチン+m.FOLFOX6療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
アバスタチン+SOX療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	21
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
アバスタチン(5mg/kg)+TS-1療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1, 15, 29	42
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-28	
アバスタチン(7.5mg/kg)+TS-1療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	21
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
アバスタチン+XELOX療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	21
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口		Day1-14	
アバスタチン+ゼローダ療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1	21
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口		Day1-14	
アバスタチン+ロンサーフ療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1, 15	28
	トリフルリジン・チピラシル	70 mg/m ²	経口		Day1-5, 8-12	
イリノテカンB法	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1	14
	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	(初回)60分 (2回目以降)30分	Day1	

サイラムザ+FOLFIRI療法	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
ベクティビックス療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14
	ベシズマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	
ベクティビックス+FOLFIRI療法	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
ベクティビックス+m.FOLFOX6療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
ベクティビックス+sLV5FU2療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
ベクティビックス+イリノテカン療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	

*1: 投与量はBSAIに基づき決定