

乳がん

レジメン名	使用薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース(日)
EC療法	エピルビシン	90 mg/m ²	点滴静注	全開	Day1	21
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
dose-dense EC療法	エピルビシン	90 mg/m ²	点滴静注	全開	Day1	14
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
	ペグフィルグラスチム	3.6 mg/body	皮下注		Day2-4のうちの1日	
DTX療法	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	21
FEC療法	フルオロウラシル	500 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	21
	エピルビシン	100 mg/m ²	点滴静注	全開	Day1	
GEM療法	シクロホスファミド	500 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	21
	ゲムシタピン	1250 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	
HER+PER+DTX療法	トラスツズマブ	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	点滴静注	90分	Day1	21
	ペルツズマブ	(初回)840 mg/body (2回目以降)420 mg/body	点滴静注	60分	Day1	
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
HER+PER+Weekly PTX療法	トラスツズマブ	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	点滴静注	90分	Day1	21
	ペルツズマブ	(初回)840 mg/body (2回目以降)420 mg/body	点滴静注	60分	Day1	
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1, 8, 15	
m.CMF療法	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	21
	メトレキサート	40 mg/m ²	点滴静注	20分	Day1	
	フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
TC療法	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	21
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
TCH療法	トラスツズマブ	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	点滴静注	90分	Day1	21
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	
	カルボプラチン	6 *AUC	点滴静注	60分	Day1	
VNR療法	ビノレルビン	25 mg/m ²	点滴静注	全開	Day1, 8	21
Weekly PTX療法	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	7

(初回)90分

アバスタチン+Weekly PTX療法	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	(2回目)60分 (3回目以降)30分	Day1, 15	28
	パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1, 8, 15	
アブラキサン療法	パクリタキセル アルブミン懸濁型	260 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	21
カドサイラ療法	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	(初回)90分 (2回目以降)30分	Day1	21
	シクロホスファミド	100 mg/m ²	経口		Day1-14	
クラシカルCMF療法	メトレキサート	40 mg/m ²	点滴静注	20分	Day1, 8	28
	フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	
ハーセプチン(3週毎)療法	トラスツズマブ	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	点滴静注 点滴静注	90分 30分	Day1	21
ハラヴェン療法	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	全開	Day1, 8	21