

膵がん

レジメン名	使用薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース(日)
FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	イリノテカン	180 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
GEM療法	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8, 15	28
GEM+TS-1療法(術前)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	21
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120 mg/body *1	経口		Day1-14	
GEM+TS-1療法(切除不能・進行再発)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	21
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	60-100 mg/body *1	経口		Day1-14	
m.FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
アブラキサン+GEM療法	パクリタキセル アルブミン懸濁型	125 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8, 15	28
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8, 15	
オニバイド50+フルオロウラシル療法	イリノテカン リポソーム製剤	50 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	
オニバイド70+フルオロウラシル療法	イリノテカン リポソーム製剤	70 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1	

*1: 投与量はBSAIに基づき決定