

胆道がん

レジメン名	使用薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース(日)
GEM療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8, 15	28
GEM+CDDP療法	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 8	21
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	
GEM+TS-1療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	21
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	60-100 mg/body *1	経口		Day1-14	
GEM+CDDP+イミフィンジ療法	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 8	21
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	
	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	60分	Day1	
イミフィンジ療法	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	60分	Day1	28
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 8	
GEM+CDDP+キイトルーダ療法(3週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8	21
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	30分	Day1	
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 8, 22, 29	
GEM+CDDP+キイトルーダ療法(6週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1, 8, 22, 29	42
	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	30分	Day1	
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1, 8, 22, 29	

*1: 投与量はBSAに基づき決定